



Ózdi Almási Balogh Pál Kórház
Intenzív Osztály
3600 Ózd, Béke u. 1-3.

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

centrális véna kanül alkalmazása

Tisztelt Betegünk!

A jelenlegi állapota szükségessé teszi, hogy Önnél centrális véna kanült helyezünk be. A beavatkozás elvégzéséhez szükséges az Ön írásos beleegyezése.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, majd – egy külön nyomtatványon - saját kezűleg írja alá a **beleegyező nyilatkozatot**. Amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, még aláírás előtt kérjen további szóbeli tájékoztatást a kezelőorvosától!

Ha az írásbeli és szóbeli tájékoztatás alapján nem kíván beleegyezni a beavatkozásban, az **elutasító nyilatkozatot** írja alá. Kérjük, fontolja meg döntését.

A beavatkozás célja:

1. Gyógyszerbejuttatás a szervezetbe, ha a perifériás vénák gyógyszeradagolásra valamilyen okból nem alkalmasak.
2. Nagy mennyiségű folyadék gyors szervezetbe juttatásának szükségessége.
3. Teljes mesterséges táplálás.
4. Perifériás vénákon keresztül nem adható gyógyszerek, oldatok infúziója, vérvételek.
5. Ideiglenes ritmusszabályozó, nyomásmérő katéter bevezetése.

A vizsgálat szükségességének indoklása; elmaradásának következményei:

Amennyiben az indokolt beavatkozást nem tudjuk végrehajtani, úgy a kezelés elmaradása miatt klinikai állapotromlás állhat be.

A beavatkozás menete:

A nyaki területen általában két vénát használhatnak a fenti beavatkozás elvégzéséhez, illetve a combhajlatban található vénát Ritkábban a kulcscsont mentén húzódó nagy vénát, combvénát, gyakrabban pedig a nyakon futó vénát használják. A beavatkozást ebben az eljárásban járatos orvos végzi, a sterilitás gondos betartása mellett, steril műszerekkel. A szúrásra kijelölt terület műtéti előkészítése mellett, lokális érzéstelenítés után a beavatkozás kb. 20-30 percet vesz igénybe. A beavatkozás után fizikális és röntgen vizsgálat történik a beavatkozás sikerének le mérésére, illetve az esetleges szövődmények azonnali felismerése érdekében.

A beavatkozás lehetséges szövődményei:

- Fertőzés
- Trombózis és vénagyulladás
- Légembólia
- Folyadék kerülhet a mellhártya lemezei közé
- Légmell

- Nyaki verőérsérülés
- Nyirokvezeték sérülés
- 8. Nyaki idegsérülés
- 9. Légcsősérülés
- 10. A nyak érzékenysége

Nagy nemzetközi statisztikák szerint a beavatkozás sikeressége 90% feletti, míg a szövődmények gyakorisága.2%-6%. Intézetünkben a szövődmények ellátásának valamennyi feltétele adott.

Teendők a beavatkozás előtt

Tekintettel arra, hogy a beavatkozás sürgős, Önnek különösebb megelőző teendője nincs. A szúrás tervezett helyén és környékén a ruházatát eltávolítjuk, szükség esetén a területet borotváljuk, otthonában szedett gyógyszereiről (különösen vérhígító gyógyszereiről vagy injekcióiról), gyógyszerallergiáról (különösen: helyi érzéstelenítők) tájékozódunk.

Teendők a beavatkozás után

A behelyezett eszközökhöz lehetőleg ne nyúljon (különösen veszélyes azok húzása), mosakodásnál, borotválkozásnál a területet kerülje el. Amennyiben a kanül helyén fájdalmat, érzékenységet, bőrpírt, duzzanatot tapasztal, vagy a kanül használatakor fájdalom jelentkezik, illetve a kanült fedő kötés meglazulását észleli, kérjük, mielőbb jelezze azt a kezelő személyzetnek.